

**CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG**

**HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH  
GIỐNG CÂY TRỒNG**

**GIỐNG BÍ ĐỎ**

**BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789**

**Hồ sơ gồm có:**

1. BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG
2. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIỐNG
3. QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG
4. KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIỐNG



*Tháng 9 năm 2026*



**CÔNG TY TNHH GIỐNG  
TOÀN NÔNG**

Số: 21/TCBLH-TN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2026

## **BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng:

**CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG**

Số nhà 18, ngõ 236, Đường Hồng Liễu, Khu đô thị Đại Thành, Khối 17, Nghi Kim, Phường Vĩnh Hưng, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0983 120 320 - email: Vantoan.nongnghiep@gmail.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789**

- Loài cây trồng: Họ bầu bí (Cucurbitaceae)

- Cấp giống: Giống ưu thế lai F1

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ, Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi giống được công bố trên Website của Công ty hoặc của Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam, hoặc đăng công báo.

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Bản công bố Thông tin giống **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789**

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789** do công ty TNHH giống Toàn Nông công bố, đạt tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03-VSTA:2020/Giá trị canh tác, giá trị sử dụng và chất lượng hạt giống của nhóm Bí các loại, do Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam xây dựng và ban hành.

- Quy trình canh tác giống **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789** do Công ty TNHH giống Toàn Nông biên soạn.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG**



**Vũ Văn Toàn**

CÔNG TY TNHH GIỐNG  
TOÀN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/TCBLH-TN

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2026

## BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG - Số nhà 18, ngõ 236, Đường Hồng Liễu, Khu đô thị Đại Thành, Khối 17, Nghi Kim, Phường Vĩnh Hưng, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0983 120 320 - email: Vantoan.nongnghiep@gmail.com

1. Tên giống cây trồng: **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789**

- Loài cây trồng: Họ bầu bí (Cucurbitaceae)

- Cấp giống: Giống ưu thế lai F1.

2. Thông tin về giống cây trồng:

2.1. Thời gian sinh trưởng (ngày): 90 – 100 ngày

- Thời gian gieo cây con trong vườn ươm: 12 – 18 ngày, tùy vụ

- Thời gian từ trồng đến thu hoạch lần đầu: 65 - 75 ngày, tùy vụ và vùng trồng

2.2. Đặc điểm nông học chính:

- Bộ phận sử dụng làm thực phẩm: (lá, nhánh, hoa, quả): quả; quả hình hạt đậu, thắt eo, dài 20-25 cm, màu xanh nhạt khi còn non và chuyển xanh kèm sọc trắng dứt quãng khi già, chín, khối lượng - 1,0-1,5 kg/quả, dày cùi, rất chắc, đặc, thịt quả màu vàng cam, thơm nhẹ

- Dạng và màu sắc lá. Lá hình tim, chia thùy, mức xẻ thùy trung bình, màu xanh, có lông trên cuống lá, gân lá trắng xanh

- Dạng và màu sắc thân. Dạng thân thảo, màu xanh trung bình có tua cuốn dễ leo

- Số lần thu hoạch/chu kỳ gieo trồng: 3 – 5 lần tùy thuộc vào thu quả non hay để già.

2.3. Vùng trồng thích hợp:

- Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ, Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Niền núi phía Bắc.

- Chân đất thích hợp: Đất cát pha, thịt trung bình và đất hơi nặng đều trồng được, tuy nhiên phù hợp nhất là đất thịt nhẹ và đất phù sa, thoát nước. Độ pH thích hợp từ 6 – 7.

- Khả năng thích ứng: Khả năng thích ứng rộng, gieo trồng trên các vùng, vụ trong cả nước.

2.4. Năng suất quả (Tấn/ha/chu kỳ gieo trồng) : 45 – 55 tấn/ha, ngoài ra còn thu lá, tia nhánh non, hoa làm rau

2.5. Chất lượng sản phẩm (chất lượng dinh dưỡng: chất xơ, vitamin, canxi...)

Sản phẩm quả tươi ăn mát, thơm nhẹ. Trong thành phần dinh dưỡng chưa nhiều chất khoáng như: canxi, phot pho, sắt, ... và những vitamin, nhất là vitamin A; tỷ lệ chất xơ (xenlulo) trong sản phẩm trên 1,0%; dùng nấu canh, xào, luộc hoặc chế biến mứt. Thịt quả màu sắc vàng tươi, nấu nhanh nhừ, nhiều bột

2.6. Mức độ chống chịu với ngoại cảnh:

18543  
CÔNG  
TY  
GIỐNG  
TOÀN  
NG - T

- Chịu rét: (các mức tốt, khá, trung bình và kém) : khá
- Chịu nóng: (các mức tốt, khá, trung bình và kém): tốt
- Chịu hạn: phục hồi tốt sau 5 ngày ngắt tưới
- Sâu bệnh chính: Kháng nhẹ các loại sâu, bệnh như: sâu tơ, sâu xanh, bệnh sương mai, phấn trắng, gỉ sắt, đốm vòng, đốm mắt cua khá tốt: điểm 1-3

#### 2.7. Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống:

Hạt giống **BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789** áp dụng theo TCCS 03-VSTA:2020 do Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam xây dựng và ban hành, các đơn vị đồng thuận áp dụng.

| Chỉ tiêu                                           | Yêu cầu |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1. Độ thuần, hạt đúng giống không nhỏ hơn % số hạt | 98,0    |
| 2. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn            | 98,0    |
| 3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn          | 80      |
| 4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn              | 9,0     |

2.8. Giống sản xuất trong nước hay nhập nội: Hạt giống nhập nội và sản xuất trong nước.

#### 2.9. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng hạt giống:

- Điều kiện bảo quản: Bảo quản hạt giống chưa sử dụng nơi thoáng mát, khô ráo.
- Thời hạn sử dụng: Đọc kỹ bao bì, nhãn mác khi mua giống, chỉ sử dụng giống còn hạn sử dụng ghi trên bao bì; nên gieo trồng ngay sau khi mua và tuân thủ kỹ thuật hướng dẫn trên bao bì.

- Khung thời vụ gieo trồng và phạm vi địa lý;

+ Vùng Bắc Trung bộ, Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc: Gieo trồng từ tháng 12 đến hết tháng 2 năm sau, thích hợp nhất là cuối tháng 1 đầu tháng 2. Thu hoạch tháng 4 - tháng 6.

+ Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Gieo trồng quanh năm, thích hợp nhất là mùa khô, gieo trồng tháng 12 - 3 năm kế tiếp, thu hoạch cuối tháng 3-tháng 6

+ Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam bộ: Gieo trồng quanh năm, thích hợp nhất trồng mùa khô từ tháng 12- tháng 4

- Quy trình gieo trồng: Theo quy trình canh tác được Công ty ban hành, kết hợp chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật địa phương.

Sử dụng sản phẩm thương phẩm: Chú ý tuân thủ quá trình thu hoạch, cách ly đúng thời gian khi sử dụng thuốc BVTV. Sản phẩm (quả) khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải đảm bảo an toàn thực phẩm, có thể chế biến muối dền, muối ngọt.

#### 2.10. Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống chỉ sử dụng cho gieo trồng, không được ăn.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên./.

CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG



Vũ Văn Toàn

**CÔNG TY TNHH GIỐNG  
TOÀN NÔNG**

Số: 23/TCBLH-TN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2026

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIỐNG BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789**

1. Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH giống Toàn Nông  
Số nhà 18, ngõ 236, Đường Hồng Liễu, Khu đô thị Đại Thành, Khối 17, Nghi Kim, Phường  
Vĩnh Hưng, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0983 120 320 - email: Vantoan.nongnghiep@gmail.com

2. Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống Bí ĐỎ TN NEW PEANUT 789 đạt TCCS 03-VSTA:2020 do Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam xây dựng và ban hành.

| Đặc điểm                                                                               | TCCS 03-VSTA: 2020                | Giống BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789 | Đánh giá |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| Thời gian sinh trưởng (ngày)                                                           | Dưới 110                          | 95-100                        | Đạt      |
| Thời gian gieo-thu lần 1 (ngày)                                                        | Dưới 70 ngày                      | 65-70                         | Đạt      |
| Chống chịu :<br>- Mốc sương (điểm)<br>- Sâu xanh (điểm)<br>- Chịu hạn (ngày ngắt tưới) | Nhỏ hơn 5<br><br>3 ngày ngắt tưới | 1<br>3<br>5                   | Đạt      |
| Năng suất TT (tấn/ha)                                                                  | Lớn hơn 25,0                      | 50-55                         | Đạt      |

**CÔNG TY TNHH GIỐNG TOÀN NÔNG**



Vũ Văn Toàn

## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG BÍ ĐỎ TN NEW PEANUT 789

### 1. Thời vụ

- Vùng Bắc Trung bộ, Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc: Gieo trồng từ tháng 12 đến tháng hết tháng 2 năm sau, thích hợp nhất là cuối tháng 1 đầu tháng 2. Thu hoạch tháng 4 - tháng 6.
- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Gieo trồng quanh năm, thích hợp nhất là mùa khô, gieo trồng tháng 12 - 3 năm kế tiếp, thu hoạch cuối tháng 3-tháng 6
- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam bộ: Gieo trồng quanh năm, thích hợp nhất trồng mùa khô từ tháng 12- tháng 4

### 2. Làm đất, bón lót

- Làm đất kỹ. Đất cần được phơi ải. Đất trồng bí nên chọn các chân đất thịt nhẹ, thoát nước tốt
- Lên luống để trồng. Mặt luống rộng 70-80 cm, cao 25-35 cm
- + Trên luống trồng hàng đơn. Đối với bí chiêm, cần có rãnh luống rộng 30 cm để thoát nước nhanh
- + Nếu trồng hàng kép thì mặt luống làm rộng 1,2 - 1,3 m, cao 25-35cm, rãnh luống rộng 30 cm
- Bón lót: Lượng phân bón lót cho 1 ha bí là: 20-25 tấn phân chuồng, 300 kg supe lân, 100 kg kali

### 3. Gieo trồng và chăm sóc

- Trên các luống đơn, các hốc cách nhau 50-60 cm. Trên các luống trồng 2 hàng, các hàng x hàng 60 cm, hốc x hốc 1 m. Các hốc phân bố trên luống theo kiểu nanh sấu. Ở mỗi hốc gieo 3-4 hạt. Về sau tỉa bớt cây ốm yếu, để lại ở mỗi hốc 2 cây. Như vậy, trên 1 ha có 13.000 - 14.000 hốc
- Trường hợp gieo hạt trong vườn ươm hoặc gieo trong bầu đất thì sau khi làm đất bỏ hốc xong đem cây non ra trồng

- Chăm sóc: Từ khi cây mọc đến khi cây bò ra cần chú ý xới đất phá váng 2-3 lần kết hợp với vun gốc cho cây

- Bón thúc vào 3 giai đoạn:

Lần thứ nhất: khi cây con có 4-6 lá thật; Lần thứ hai: khi cây có nụ, có hoa; Lần thứ ba: khi cây có quả non; Ở các lần bón thúc có dùng phân ngâm hoai mục pha vào nước, nước giải hoặc phân urê pha loãng tưới cho cây

- Lấp dây bí, nung dây và làm giàn. Khi thân cây bí bò ra dài 50 cm, thì lấy đất lấp lên ở vị trí các đốt. Cứ cách 1-2 đốt lại lấp, chôn lên 1 đốt để cây ra nhiều rễ bất định, hướng cho ngọn bí bò từ hốc này sang hốc kia. Sáu đốt mới nung dây cho bí bò lên giàn. Dùng lát mềm buộc thân cây bí vào giàn, buộc ở vị trí dưới nách lá. Giàn cắm chéo như mái nhà. Số lượng cây cắm giàn cần cho 100 m<sup>2</sup> là 300 - 350 cây sệt cùng với 3-4 cây tre hoặc nứa

Đối với bí xuân hè, do thường gặp đông và mưa đầu vụ cho nên cần chú ý thoát nước kịp thời, làm giàn thấp và vững chắc

- Tỉa cành, bấm ngọn, gác quả. Mỗi dây bí chỉ để 1 nhánh chính, 2-3 nhánh phụ chèo. Trong giai đoạn ra hoa, ra quả rộ, cần bấm bớt ngọn và hoa dư. Cần chú ý điều chỉnh cho cuống quả bí nằm vào chỗ 2 cây sệt giao nhau nếu làm giàn. Trường hợp không làm được giàn để quả bí nằm dài trên mặt đất thì phải lót rơm rạ để đỡ quả

Bí đở lại ra nhánh khoẻ, tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng, không có lợi cho việc kết quả, cho nên cần ngắt nhánh kịp thời, chỉ để lại ở mỗi dây bí chính và 2-3 dây chèo

#### 4. Phòng trừ sâu bệnh

- Các loài sâu hại:

+Bọ nhảy (*Phyllotreta rectilineata* Chen). Bọ nhảy thường cắn thủng lá lỗ chỗ. Sâu non cắn rễ phụ dưới đất, đục vào gốc rễ làm cây úa vàng dần rồi chết

Hàng năm bọ nhảy xuất hiện và phá hoại mạnh 2 đợt: vào các tháng 3-5 và 7-9. Vòng đời dài 19-54 ngày. Trong đó thời gian trứng là 3-9 ngày, sâu non 13-28 ngày, bọ trưởng thành 3- 17 ngày

Phòng trừ:

\*Làm sạch cỏ trong vườn ươm, ở bờ ruộng; Luân canh với các cây trồng khác

\* Khi mật độ cao phòng trừ bằng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, chỉ sử dụng thuốc BVTV trong danh mục được phép trên rau.

+Ban miêu đen: *Epicanta impressicornis* Pic. Ban miêu đen phát sinh quanh năm và phân bố rộng ở nhiều nơi. Bọ trưởng thành ăn lá nhiều loại cây trồng

Phòng trừ: Chỉ tiến hành khi bọ trưởng thành tập trung với mật độ cao và gây hại rõ rệt. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu trong danh mục cho phép

+Sâu róm đường chỉ dò: *Porthesia scintillans* Walk

Sâu phân bố rộng trên nhiều vùng, phá hoại nhiều loại cây trồng. Sâu thường phát sinh với mật độ thấp nhưng cũng có những trường hợp xuất hiện với mật độ cao và gây ra tác hại lớn, có thể ăn trụi các lá cây trồng trên nhiều ruộng

+Sâu róm nâu: *Amsacta lactinea* Cramer. Bướm sâu róm nâu thích ánh sáng đèn. Sâu non hoạt động nhanh nhẹn và rất phàm ăn. Chúng ăn lá hoa, quả thân cây. Sâu phát sinh quanh năm, nhưng chỉ một đôi khi mới gây thành dịch

\*Phòng trừ: Chỉ tiến hành phòng trừ khi sâu xuất hiện với mật độ cao. Dùng các loại thuốc trừ sâu ăn lá thường dùng có trong danh mục được Bộ NNPTNT công bố.

Sâu xám ; Sâu khoang ; Sâu xanh

+ Các loại bệnh thường gặp:

Bệnh phấn trắng, Mốc sương, Héo xanh, nứt dây xì mù

Phòng trừ:

- Thu dọn sạch mọi tàn dư cây trên ruộng sau mỗi vụ thu hoạch

- Chăm bón cây kịp thời

- Phun thuốc trừ bệnh khi bệnh xuất hiện nhiều

Dùng thuốc BVTV trong danh mục phun lúc trời mát, vào sáng sớm hoặc chiều tối theo hướng dẫn của chuyên môn. Ngoài ra các bệnh lở cổ rễ; bệnh chết héo xanh; bệnh thối quả

#### 5. Thu hoạch

Thu hoạch bí tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi dạng và đặc điểm của tập quán địa phương, thường 1 cây để vài quả, cho nên quả đầu cần thu hoạch sớm, khi quả nặng trên 1-1,5 kg. Thu sớm để cây tập trung nuôi các quả sau, sau khi ra hoa đậu quả 50-60 ngày là có thể thu hoạch được; Hạt Bí đở là bí lai F1 không làm được giống cho vụ sau.

CÔNG TY TNHH CÔNG TY GIỚI THIỆU



Vũ Văn Toàn